Scienziati in Erba Chimica

Acqua

Oro

Zucchero

I Legami Chimici

Il legame chimico

il legame ionico

il legame covalente

Polare
Dativo

...

Gli elettroni di valenza sono gli elettroni del livello più esterno di un atomo. Gli elettroni di valenza sono quelli che partecipano alla formazione del legame.

<u>Gruppo</u>	<u>Config. Elettr.</u>	<u>n° di e⁻ di valenza</u>
1A	ns^1	1
2A	ns^2	2
3A	ns^2np^1	3
4A	ns^2np^2	4
5A	ns^2np^3	5
6A	ns^2np^4	6
7A	ns^2np^5	7

Simbologia di Lewis per gli elementi rappresentativi ed i gas nobili

1 1A	2 2A	3 3B	4 4B	5 5B	6 6B	7 7B	8 8B	9	10	11 1B	12 2B	13 3A	14 4A	15 5A	16 6A	17 7A	18 8A
•H																	He:
•Li	•Be•											•B•	•C•	•N•	•O•	•F•	•Ne•
•Na	•Mg•											•Al•	•Si•	•P•	•S•	•Cl•	•Ar•
•K	•Ca•											•Ga•	•Ge•	•As•	•Se•	•Br•	•Kr•
•Rb	•Sr•											•In•	•Sn•	•Sb•	•Te•	•I•	•Xe•
•Cs	•Ba•											•Tl•	•Pb•	•Bi•	•Po•	•At•	•Rn•
•Fr	•Ra•																

Il Legame Ionico

Un *legame covalente* è un legame in cui due o più elettroni sono condivisi da due atomi

Perché due atomi dovrebbero condividere elettroni?

Struttura di Lewis di F₂

Struttura di Lewis dell' acqua

Legame doppio – due atomi condividono due coppie di elettroni

Triple bond – two atoms share three pairs of electrons

Un *legame covalente polare* o *legame polare* è un legame covalente con una elevata densità elettronica attorno ad uno dei due atomi

Legami Sigma (σ) and Pi greco (π)

Legame singolo

1 legame sigma

Legame doppio

1 legame sigma e 1 legame pi greco

Legame triplo

1 legame sigma e 2 legami pi greco

Quanti legami σ e π sono presenti nella molecola di acido acetico (aceto) CH_3COOH ?

legami $\sigma = 6 + 1 = 7$

legami $\pi = 1$

L' Elettronegatività è la capacità di un atomo di attrarre verso se stesso gli elettroni di legame

Affinità elettronica

Energia di Ionizzazione

L' elettronegatività degli elementi più comuni

Aumento dell'elettronegatività

1A												3A					4A	5A	6A	7A	8A
H 2.1												B 2.0	C 2.5	N 3.0	O 3.5	F 4.0					
Li 1.0	Be 1.5											Al 1.5	Si 1.8	P 2.1	S 2.5	Cl 3.0					
Na 0.9	Mg 1.2	3B	4B	5B	6B	7B	8B			1B	2B	Ga 1.6	Ge 1.8	As 2.0	Se 2.4	Br 2.8	Kr 3.0				
K 0.8	Ca 1.0	Sc 1.3	Ti 1.5	V 1.6	Cr 1.6	Mn 1.5	Fe 1.8	Co 1.9	Ni 1.9	Cu 1.9	Zn 1.6	In 1.7	Su 1.8	Sb 1.9	Te 2.1	I 2.5	Xe 2.6				
Rb 0.8	Sr 1.0	Y 1.2	Zr 1.4	Nb 1.6	Mo 1.8	Tc 1.9	Ru 2.2	Rh 2.2	Pd 2.2	Ag 1.9	Cd 1.7	Tl 1.8	Pb 1.9	Bi 1.9	Po 2.0	At 2.2					
Cs 0.7	Ba 0.9	La-Lu 1.0-1.2	Hf 1.3	Ta 1.5	W 1.7	Re 1.9	Os 2.2	Ir 2.2	Pt 2.2	Au 2.4	Hg 1.9										
Fr 0.7	Ra 0.9																				

Classificazione dei legami in base alla differenza di elettronegatività

Differenza

0

≥ 2

$0 < e < 2$

Tipo di legame

Covalente

Ionico

Covalente Polare

Aumento della differenza di elettronegatività

Covalente

Covalente Polare

Ionico

condividono e⁻

parziale trasferimento
di e⁻

trasferimento di
e⁻

Classifica i seguenti legami come ionici, covalenti polari o covalenti: Il legame in CsCl; il legame in H₂S; e il legame NN in H₂NNH₂.

Cs – 0.7

Cl – 3.0

$$3.0 - 0.7 = 2.3$$

Ionico

H – 2.1

S – 2.5

$$2.5 - 2.1 = 0.4$$

Covalente Polare

N – 3.0

N – 3.0

$$3.0 - 3.0 = 0$$

Covalente

La variazione di entalpia richiesta per rompere un particolare legame in una mole di molecole gassose è detta *energia di legame*.

Energia di Legame

Energia di legame

Legame singolo < Legame doppio < Legame triplo

Forze intermolecolari

Le forze intermolecolari sono forze attrattive tra molecole.

Le forze intramolecolari tengono insieme gli atomi in una molecola.

Intermolecolari vs Intramolecolari

- 41 kJ per vaporizzare 1 mole di acqua (inter)
- 930 kJ per rompere tutti i legami O-H in 1 mole di acqua (intra)

In genere, le forze intermolecolari sono più deboli delle forze intramolecolari.

“Misura” delle forze intermolecolari

Punto di ebollizione

Punto di fusione

$$\Delta H_{\text{vap}}$$

$$\Delta H_{\text{fus}}$$

Forze intermolecolari

Forze dipolo - dipolo

Forze attrattive tra molecole polari

Orientamento delle molecole polari in un solido

Forze intermolecolari

Forze ione - dipolo

Forze attrattive tra uno ione e una molecola polare

Interazione ione - dipolo

Forze intermolecolari

Legame idrogeno

Il *legame idrogeno* è una speciale interazione dipolo-dipolo tra l'atomo di idrogeno coinvolto in un legame polare, come N-H, O-H o F-H, e un atomo elettronegativo O, N o F.

A e B sono N, O, o F

Relazioni di massa nelle reazioni chimiche

Massa atomica è la massa di un atomo espressa in unità di massa atomica (uma)

Per definizione:
1 atomo ^{12}C “pesa” 12 uma

Con questa scala

$^1\text{H} = 1.008 \text{ uma}$

$^{16}\text{O} = 16.00 \text{ uma}$

1 1A H 1.008	2 2A He 4.003											13 3A B 10.81	14 4A C 12.01	15 5A N 14.01	16 6A O 16.00	17 7A F 19.00	18 8A Ne 20.18
3 Li 6.941	4 2A Be 9.012											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
11 Na 22.99	12 Mg 24.31	3 3B Sc 44.96	4 4B Ti 47.88	5 5B V 50.94	6 6B Cr 52.00	7 7B Mn 54.94	8 8B Fe 55.85	9 8B Co 58.93	10 8B Ni 58.69	11 1B Cu 63.55	12 2B Zn 65.39	13 Ga 69.72	14 Ge 72.59	15 As 74.92	16 Se 78.96	17 Br 79.90	18 Kr 83.80
19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.88	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.39	31 Ga 69.72	32 Ge 72.59	33 As 74.92	34 Se 78.96	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.94	43 Tc (98)	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57 La 138.9	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.9	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po (210)	85 At (210)	86 Rn (222)
87 Fr (223)	88 Ra (226)	89 Ac (227)	104 Rf (257)	105 Ha (260)	106 Sg (263)	107 Ns (262)	108 Hs (265)	109 Mt (266)	110	111	112						

24 — Atomic number
Cr
 52.00 — Atomic mass

Massa atomica media (6.941)

Metals
 Metalloids
 Nonmetals

58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm (147)	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
90 Th 232.0	91 Pa (231)	92 U 238.0	93 Np (237)	94 Pu (242)	95 Am (243)	96 Cm (247)	97 Bk (247)	98 Cf (249)	99 Es (254)	100 Fm (253)	101 Md (256)	102 No (254)	103 Lr (257)

Dozzina = 12

Coppia = 2

La *mole (mol)* è la quantità di una sostanza che contiene tante unità elementari (atomi, molecole o altre particelle) quanti sono gli atomi contenuti esattamente in 12 g di ^{12}C

$$1 \text{ mol} = N_A = 6.0221367 \times 10^{23}$$

Numero di Avogadro (N_A)

Massa molare è la massa di 1 mole di **uova**
scarpe in grammi
marmi
atomi

$$1 \text{ mole atomi } ^{12}\text{C} = 6.022 \times 10^{23} \text{ atomi} = 12.00 \text{ g}$$

$$1 \text{ atomo } ^{12}\text{C} = 12.00 \text{ uma}$$

$$1 \text{ mole atomi } ^{12}\text{C} = 12.00 \text{ g } ^{12}\text{C}$$

$$1 \text{ mole atomi litio} = 6.941 \text{ g di Li}$$

Per ogni elemento
massa atomica (uma) = massa molare (grammi)

Una mole di:

È chiaro cos'è la massa molare?

Quanti atomi ci sono in 0.551 g di potassio (K) ?

$$1 \text{ mol K} = 39.10 \text{ g K}$$

$$1 \text{ mol K} = 6.022 \times 10^{23} \text{ atomi K}$$

$$0.551 \text{ g K} \times \frac{1 \text{ mol K}}{39.10 \text{ g K}} \times \frac{6.022 \times 10^{23} \text{ atomi K}}{1 \text{ mol K}} =$$

$$8.49 \times 10^{21} \text{ atomi K}$$

Massa molecolare (o peso molecolare) è la somma delle masse atomiche (in uma) in una molecola.

$$\begin{array}{r} 1\text{S} \qquad 32.07 \text{ uma} \\ 2\text{O} \quad \underline{+ 2 \times 16.00 \text{ uma}} \\ \text{SO}_2 \qquad 64.07 \text{ uma} \end{array}$$

Per ogni molecola
massa molecolare (uma) = massa molare (grammi)

$$1 \text{ molecola SO}_2 = 64.07 \text{ uma}$$

$$1 \text{ mole SO}_2 = 64.07 \text{ g SO}_2$$

La composizione percentuale di un elemento in un composto =

$$\frac{n \times \text{massa molare elemento}}{\text{massa molare composto}} \times 100\%$$

n è il numero di moli dell'elemento in **1 mole** del composto

$$\%C = \frac{2 \times (12.01 \text{ g})}{46.07 \text{ g}} \times 100\% = 52.14\%$$

$$\%H = \frac{6 \times (1.008 \text{ g})}{46.07 \text{ g}} \times 100\% = 13.13\%$$

$$\%O = \frac{1 \times (16.00 \text{ g})}{46.07 \text{ g}} \times 100\% = 34.73\%$$

$$52.14\% + 13.13\% + 34.73\% = 100.0\%$$

Composizione percentuale e formula empirica

Determina la formula empirica di un composto che ha la seguente composizione percentuale in massa: K 24.75%, Mn 34.77%, O 40.51%.

$$n_{\text{K}} = 24.75 \text{ g K} \times \frac{1 \text{ mol K}}{39.10 \text{ g K}} = 0.6330 \text{ mol K}$$

$$n_{\text{Mn}} = 34.77 \text{ g Mn} \times \frac{1 \text{ mol Mn}}{54.94 \text{ g Mn}} = 0.6329 \text{ mol Mn}$$

$$n_{\text{O}} = 40.51 \text{ g O} \times \frac{1 \text{ mol O}}{16.00 \text{ g O}} = 2.532 \text{ mol O}$$

Composizione percentuale e formula empirica

$$n_{\text{K}} = 0.6330, n_{\text{Mn}} = 0.6329, n_{\text{O}} = 2.532$$

$$\text{K} : \frac{0.6330}{0.6329} \approx 1.0$$

$$\text{Mn} : \frac{0.6329}{0.6329} = 1.0$$

$$\text{O} : \frac{2.532}{0.6329} \approx 4.0$$

Le soluzioni

(a)

(b)

(c)

Una **soluzione** è una miscela **omogenea** (la sua composizione e le sue proprietà sono uniformi in ogni parte del campione) di due o più sostanze formate da ioni o molecole.

Le soluzioni possono esistere in ognuno dei tre stati della materia: **gas, liquido o solido**.

Il **solvente** è il componente presente in quantità maggiore o che determina lo stato della materia in cui la soluzione esiste.

Il **soluto** è un componente presente in quantità minore.

Il caso più comune è quello di soluzioni liquide (soluzioni di gas, solidi o liquidi sciolti in un liquido).

Si possono però avere:

Soluzioni gassose: in genere i gas possono mescolarsi in tutte le proporzioni per dare soluzioni gassose.

Soluzioni liquide: sono le più comuni e sono ottenute nella maggior parte dei casi sciogliendo un gas o un solido in un liquido.

Soluzioni solide: sono principalmente **leghe** di due o più metalli. Le leghe di mercurio (l'unico metallo liquido) con altri metalli sono chiamate **amalgame** e possono essere sia liquide che solide).

Solubilità

In generale solo una quantità finita di un solido si scioglie in un dato volume di solvente dando luogo ad una soluzione **satura**, cioè una soluzione in equilibrio con un eventuale solido in eccesso.

**Equilibrio
dinamico**

La concentrazione del soluto nella soluzione satura è detta **solubilità**. Ad esempio la solubilità di NaCl in acqua è di 36 g per 100 ml di acqua a 20°C.

Concentrazione delle Soluzioni

In generale la **concentrazione** di una soluzione è una misura della quantità di soluto presente in una data quantità di solvente (o di soluzione).

La quantità di soluto o di solvente possono essere espresse in numero di moli, massa o volume per cui vi sono diversi modi di esprimere la concentrazione di una soluzione:

- Molarità
- Percentuale in massa (peso)
- Molalità
- Frazione molare

Molarità

E' il numero di moli di soluto presenti in un litro di soluzione:

$$\text{Molarità} = \frac{\text{moli di soluto}}{\text{litri di soluzione}}$$

Le unità sono mol/litro ma sono generalmente indicate con **M**.

Ad esempio una soluzione ottenuta sciogliendo 0,20 moli di NaCl in acqua **sino ad un volume di 2,0 l** ha molarità:

$$\frac{0,20 \text{ moli}}{2,0 \text{ litri}} = 0,10 \text{ mol/l} = 0,10 \text{ M}$$

Preparazione in laboratorio di una soluzione 0,01M di di K_2MnO_4
0,0025 moli (0,395 g) in 250 ml di acqua

(a)

(b)

(c)

Charles D. Winters

Percentuale in massa di soluto

E' definita come:

$$\% \text{ massa di soluto} = \frac{\text{massa di soluto}}{\text{massa della soluzione}} \times 100$$

Ad esempio per una soluzione ottenuta mescolando 3,5 g di NaCl e 96,5 g di acqua si ha:

$$\% \text{ massa NaCl} = \frac{3,5 \text{ g}}{3,5 \text{ g} + 96,5 \text{ g}} \times 100 = 3,5 \%$$

Tale soluzione contiene 3,5 g di NaCl per 100 g di soluzione

Molalità

E' il numero di moli di soluto per chilo di solvente:

$$\text{molalità} = \frac{\text{moli di soluto}}{\text{Kg di solvente}}$$

Le unità sono mol/Kg ma sono generalmente indicate con **m**.

Ad esempio una soluzione ottenuta sciogliendo 0,20 moli di NaCl in 2000 g di acqua ha molalità:

$$\frac{0,20 \text{ moli}}{2,0 \text{ Kg}} = 0,10 \text{ mol/Kg} = 0,10 \text{ m}$$

Esempio: Calcolare la molalità di una soluzione ottenuta sciogliendo 5,67 g di glucosio ($C_6H_{12}O_6$) in 25,2 g di acqua

$$n_{\text{glucosio}} = \frac{5,67 \text{ g}}{180,2 \text{ g/mol}} = 0,0315 \text{ mol}_{\text{glucosio}}$$

$$\text{molalità} = \frac{0,0315 \text{ mol}}{25,2 \times 10^{-3} \text{ Kg}} = 1,25 \text{ m}$$

Frazione molare

Per una soluzione fra due componenti A e B la frazione molare di A è definita:

$$x_A = \frac{\text{moli di A}}{\text{moli totali soluzione}} = \frac{\text{moli di A}}{\text{moli di A} + \text{moli di B}}$$

Ad esempio in una soluzione ottenuta sciogliendo 0,0315 moli di glucosio in 25,2 g di acqua la frazione molare del glucosio è:

$$n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{25,2 \text{ g}}{18,0 \text{ g/mol}} = 1,40 \text{ mol}_{\text{H}_2\text{O}} \quad x_{\text{glucosio}} = \frac{0,0315}{0,0315 + 1,40} = 0,022$$

$$x_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1,40}{0,0315 + 1,40} = 0,978$$

$$x_{\text{H}_2\text{O}} + x_{\text{glucosio}} = 1$$

Conversione fra unità di concentrazione

Conviene far riferimento ad una certa quantità di solvente o di soluzione, determinare le quantità di soluto e di solvente corrispondenti e riutilizzarle per il calcolo della nuova concentrazione.

Le quantità di riferimento per le concentrazioni da convertire sono:

Molalità	1 Kg di solvente
Molarità	1 litro di soluzione
Frazione molare	1 mole di soluzione
% massa	100 g di soluzione

Quando è implicata la **molarità** è necessario conoscere la **densità** della soluzione (mette in relazione massa e volume).

Molalità → Frazione molare

Una soluzione di glucosio è 0,120 m. Calcolare le frazioni molari di glucosio e acqua.

Tale soluzione contiene 0,120 moli di glucosio per 1 Kg di solvente (acqua). Si ha quindi:

$$\text{moli}_{\text{glucosio}} = 0,120$$

$$\text{moli}_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{1000 \text{ g}}{18 \text{ g/mol}} = 55,6 \text{ mol}$$

$$X_{\text{glucosio}} = \frac{0,120}{0,120 + 55,6} = 0,00215$$

$$X_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{55,6}{0,120 + 55,6} = 0,998$$

Molalità $\longrightarrow$ % massa

Calcolare la % in massa di una soluzione di glucosio 0,120 m.

Tale soluzione contiene 0,120 moli di glucosio per 1 Kg di solvente (acqua). Si ha quindi:

$$\text{massa}_{\text{glucosio}} = 0,120 \text{ mol} \times 180,2 \text{ g/mol} = 21,6 \text{ g}$$

$$\text{massa}_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \text{ g}$$

$$\% \text{ massa}_{\text{glucosio}} = \frac{21,6}{1000 + 21,6} \times 100 = 2,11 \%$$

Frazione molare → Molalità

Calcolare la molalità di una soluzione acquosa di glucosio la cui frazione molare è 0,150.

1 mole di tale soluzione contiene 0,150 moli di glucosio e $(1 - 0,150) = 0,850$ moli di acqua. Si ha quindi:

$$\text{massa}_{\text{H}_2\text{O}} = 0,850 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 15,3 \text{ g}$$

$$\text{molalità}_{\text{glucosio}} = \frac{0,150 \text{ mol}}{15,3 \times 10^{-3} \text{ Kg}} = 9,8 \text{ m}$$

Frazione molare → % massa

Calcolare la % in massa di una soluzione acquosa di glucosio la cui frazione molare è 0,150.

1 mole di tale soluzione contiene 0,150 moli di glucosio e $(1 - 0,150) = 0,850$ moli di acqua. Si ha quindi:

$$\text{massa}_{\text{glucosio}} = 0,150 \text{ mol} \times 180,2 \text{ g/mol} = 27,0 \text{ g}$$

$$\text{massa}_{\text{H}_2\text{O}} = 0,850 \text{ mol} \times 18 \text{ g/mol} = 15,3 \text{ g}$$

$$\% \text{ massa}_{\text{glucosio}} = \frac{27,0 \text{ g}}{27,0 \text{ g} + 15,3 \text{ g}} \times 100 = 63,8 \%$$

Molalità → Molarità

Calcolare la molarità di una soluzione 0,273 m di KCl in acqua, avente densità $1,011 \times 10^3$ g/l.

Per 1 Kg di solvente vi sono 0,273 moli di KCl e quindi:

$$\text{massa}_{\text{KCl}} = 0,273 \text{ mol} \times 74,6 \text{ g/mol} = 20,4 \text{ g}$$

La massa totale di soluzione è:

$$\text{massa}_{\text{tot}} = \text{massa}_{\text{KCl}} + \text{massa}_{\text{H}_2\text{O}} = 1000 \text{ g} + 20,4 \text{ g} = 1020 \text{ g} = 1,02 \times 10^3 \text{ g}$$

Nell'espressione per il calcolo della molarità c'è però il volume in litri della soluzione, calcolabile tramite la densità:

$$d = \frac{\text{massa}}{\text{volume}}$$

$$\text{volume} = \frac{\text{massa}}{d} = \frac{1,02 \times 10^3 \text{ g}}{1,011 \times 10^3 \text{ g/l}} = 1,009 \text{ l}$$

$$\text{molarità} = \frac{0,273 \text{ mol}}{1,009 \text{ l}} = 0,271 \text{ M}$$

Si noti che per soluzioni diluite molarità $\approx$ molalità

Molarità → Molalità

Calcolare la molalità di una soluzione 0,907 M di $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ in acqua, avente densità 1,252 g/ml.

Per 1 litro di soluzione vi sono 0,907 moli di $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$. La massa di un litro di soluzione è:

$$\text{massa}_{\text{soluzione}} = \text{volume} \times d = 1,000 \times 10^3 \text{ ml} \times 1,252 \text{ g/ml} = 1252 \text{ g}$$

La massa di $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ è:

$$\text{massa}_{\text{Pb}(\text{NO}_3)_2} = 0,907 \text{ mol} \times 331,2 \text{ g/mol} = 300 \text{ g}$$

La massa di acqua è:

$$\text{massa}_{\text{H}_2\text{O}} = 1252 \text{ g} - 300 \text{ g} = 952 \text{ g}$$

La molalità è quindi:

$$\text{molalità} = \frac{0,907 \text{ mol}}{0,952 \text{ Kg}} = 0,953 \text{ m}$$

Numero di ossidazione

Il numero di ossidazione di un elemento corrisponde alla carica che esso acquista o perde nel diventare ione...

Il numero di ossidazione dell'ossigeno è generalmente -2 .
Nell' H_2O_2 e O_2^{2-} è -1 .

Il numero di ossidazione dell'idrogeno è $+1$ *eccetto quando è legato ad un metallo in un composto binario*. In questi casi, il suo numero di ossidazione è -1 .

I metalli del Gruppo IA sono **+1**, i metalli IIA sono **+2** e il fluoruro è sempre **-1**.

La somma dei numeri di ossidazione di tutti gli atomi in una molecola o in uno ione è uguale alla carica sulla molecola o sullo ione.

I numeri di ossidazione di tutti gli atomi in HCO_3^- ?

$$\text{O} = -2 \quad \text{H} = +1$$

$$3x(-2) + 1 + ? = -1$$

$$\text{C} = +4$$

Nomenclatura chimica (tradizionale)

- **Ossidi**

Composti binari caratterizzati dalla presenza di metallo e ossigeno:

CaO: Ossido di calcio

K₂O: Ossido di potassio

- **Ossidi del Ferro**

Il ferro ha numeri di ossidazione +2 e +3

Il metallo con numero di ossidazione più basso: -oso

FeO: ossido ferroso

Il metallo con numero di ossidazione più basso: -ico

Fe₂O₃: ossido ferrico

Nomenclatura chimica (tradizionale)

- **Perossidi**

Due ossigeni legati tra loro... H_2O_2

- **Idrossidi**

Sono caratterizzati dal gruppo ossidrile $-\text{OH}$

NaOH Idrossido di sodio

$\text{Fe}(\text{OH})_2$ idrossido ferroso

$\text{Fe}(\text{OH})_3$ idrossido ferrico

Nomenclatura chimica (tradizionale)

- **Anidride**

Sono caratterizzati dalla presenza di non metalli e ossigeno:

CO_2 : anidride carbonica

CrO_3 : anidride cromica

Se il non metallo ha:

- un solo numero di ossidazione: -ica
- due numeri di ossidazione: 1-4 -osa, 5-7 -ica
- SO_2 anidride solforosa; SO_3 anidride solforica
- due numeri di ossidazione: tutti e due tra 1-4 -ipo
- Cl_2O anidride ipoclorosa; Cl_2O_3 a. clorosa
- due numeri di ossidazione: tutti e due tra 5-7 -per
- MnO_3 anidride manganica; Mn_2O_7 a. permanganica

Nomenclatura chimica (tradizionale)

- **Acidi**

Sono composti che in acqua producono ioni H^+

- Idracidi
- Ossiacidi

- **Idracidi**

Sono composti caratterizzati dalla presenza di idrogeno e un non metallo:

- HCl Acido cloridrico
- H₂S Acido solfidrico

- **Ossiacidi**

Sono composti caratterizzati dalla presenza di idrogeno, ossigeno e un non metallo:

- H₂SO₄ Acido solforico

Nomenclatura chimica (tradizionale)

- **Sale**

Sono composti che si ottengono per sostituzione parziale o totale degli idrogeni di un acido con uno ione metallico: NaCl da HCl

Suffisso acido

-idrico

-oso

-ico

Suffisso sale

-uro

-ito

-ato

Relazioni di massa nelle reazioni chimiche

Il processo nel quale una sostanza (o più sostanze) si trasforma in una (o più) sostanze diverse è detto *reazione chimica*

Una *equazione chimica* utilizza simboli chimici per mostrare quello che avviene durante una reazione chimica

reagenti → prodotti

Come “leggere” un’ equazione chimica

2 atomi Mg + 1 molecola O₂ danno 2 unità formula MgO

2 moli Mg + 1 mole O₂ danno 2 moli MgO

48.6 grammi Mg + 32.0 grammi O₂ danno 80.6 g MgO

NON E’

2 grammi Mg + 1 grammo O₂ dà 2 grammi MgO

Bilanciare le equazioni chimiche

1. Scrivi la formula corretta per i reagenti e per i prodotti, che compaiono rispettivamente dal lato sinistro e destro dell'equazione.

L'etano reagisce con l'ossigeno per formare diossido di carbonio e acqua

2. Cambia i numeri dinanzi alle formule chimiche (*coefficienti stechiometrici*) per ottenere lo stesso numero di atomi di ogni elemento da entrambi i lati dell'equazione. Non modificare gli indici.

Bilanciare le equazioni chimiche

3. Inizia a bilanciare gli elementi che appaiono in un solo reagente e prodotto.

2 carbonio
a sinistra

1 carbonio
a destra

moltiplica CO_2 per 2

6 idrogeno
a sinistra

2 idrogeno
a destra

moltiplica H_2O per 3

Bilanciare le equazioni chimiche

5. Controlla di avere lo stesso numero di ogni tipo di atomo da entrambi i lati dell'equazione.

4 C (2 x 2)

4 C

12 H (2 x 6)

12 H (6 x 2)

14 O (7 x 2)

14 O (4 x 2 + 6)

<u>Reagenti</u>	<u>Prodotti</u>
4 C	4 C
12 H	12 H
14 O	14 O

Quantità di Reagenti e Prodotti

1. Scrivi l'equazione chimica bilanciata
2. Trasforma in moli le quantità note di sostanze
3. Utilizza i coefficienti dell'equazione chimica bilanciata per calcolare il numero di moli delle sostanze in quantità non nota
4. Trasforma le moli delle sostanze nelle unità richieste

Il metanolo brucia in aria secondo l'equazione

Se 209 g di metanolo sono utilizzati per la combustione, quanta massa di acqua viene prodotta?

grammi CH_3OH $\longrightarrow$ moli CH_3OH $\longrightarrow$ moli H_2O $\longrightarrow$ grammi H_2O

massa molare
 CH_3OH

coefficienti
equazione chimica

massa molare
 H_2O

$$209 \text{ g } \cancel{\text{CH}_3\text{OH}} \times \frac{1 \text{ mol } \cancel{\text{CH}_3\text{OH}}}{32.0 \text{ g } \cancel{\text{CH}_3\text{OH}}} \times \frac{4 \text{ mol } \cancel{\text{H}_2\text{O}}}{2 \text{ mol } \cancel{\text{CH}_3\text{OH}}} \times \frac{18.0 \text{ g } \text{H}_2\text{O}}{1 \text{ mol } \cancel{\text{H}_2\text{O}}} =$$

235 g H_2O